


Atteintes corporelles initiales

Les lésions élémentaires

Régions corporelles atteintes par type d'usagers, toutes gravités



Lésions les plus fréquentes AIS 1 « mineures »

- **étirement de la colonne cervicale sans fracture ni luxation**
- **contusion du cou**
- **érosions cutanées**
- **contusion du genou**
- **hématome du membre inférieur**
- **contusion de l'épaule**
- **hématome du thorax**


Lésions les plus fréquentes AIS 2 « modérées »

- fracture simple du radius
- fracture de la clavicule
- fracture du carpe ou du métacarpe
- fracture du péroné
- entorse du genou
- fracture de doigt(s)
- fracture du sternum

Lésions les plus fréquentes AIS 3 « sérieuses »

- **fracture ouverte, déplacée**
 - du radius
 - du tibia
 - du cubitus
 - du fémur
 - de l'humérus
- **contusion pulmonaire unilatérale**
- **hémorragie sous-arachnoïdienne**
- **fracture complexe du bassin**

Répartition des régions corporelles touchées de façon sévère à maximale MAIS 4+



Lésions les plus fréquentes AIS 4 « sévères »

- **contusion pulmonaire bilatérale**
- **hématome intracérébral**
- **fractures pluricostales avec hémato ou pneumothorax**
- **volets costaux**
- **hématome sous-dural petit**
- **hémorragie cérébrale intra-ventriculaire**
- **fracture complexe de la base du crâne**
- **œdème cérébral modéré**
- **plaie majeure de rate**
- **hématome extradural petit**


Lésions les plus fréquentes AIS 5 « critiques »

- œdème cérébral sévère
- volet costal bilatéral
- lésion axonale diffuse du cerveau
- fractures pluricostales bilatérales
avec hémoro ou pneumothorax
- contusion du tronc cérébral
- hématome intracérébral petit bilatéral
- hématome sous-dural volumineux
- hématome sous-dural bilatéral
- hématome extradural volumineux

Lésions les plus fréquentes AIS 6 toujours mortelles

- **destruction massive du crâne et du cerveau**
- **écrasement bilatéral du thorax**
- **plaie moelle épinière de niveau C3 ou au-dessus**
- **décapitation**
- **arrachement du foie**
- **plaie majeure de l'aorte thoracique**
- **carbonisation**

Régions corporelles touchées par des lésions avec séquelles prévisibles sérieuses (IIS3 +) par type d'usager



Lésion la plus fréquente pour chaque niveau de séquelle prévue

- IIS 1 entorse cervicale
- IIS 2 fracture complexe du bassin
- IIS 3 luxation du genou
- IIS 4 hématome sous dural petit
- IIS 5 lésion axonale diffuse
- IIS 6 contusion du tronc cérébral